Lu 1.° ⊗

Au 2°.

No. 69.

Observation

Sur un abcés formé entre le peritoine, et les muscles du bas ventre

par mr. Try.

Personne n'ignore que l'anatomie ne soit le flambeau qui doit Eclairer le Chirurgien dans ses operations. il y á Cependant des cas où Elle seule pourroit induire en Erreur si l'on ne Connoissoit pas par la pathologie les Changemens qui arrivent à nos parties lorsqu'elles sont atteintes de quelque maladie.

+ La tenuité naturelle du peritoine, et la force, et l'Epaisseur des muscles du bas ventre, ont toujours fait Craindre que les abcés formés Entre Ces parties ne se fissent plutôt jour dans l'interieur de l'abdomen qu'a l'exterieur; ce qui á fait recommander par plusieurs praticiens d'ouvrir ces sortes d'abcés avant leur Maturité; C'est à dire des qu'on à le moindre soubçon qu'il y á un peu de matiere rassemblée.

+ Mais je pense que cette methode, qui peut Etre dangereuse, ne doit point Etre suivie, si l'on fait attention que dans ce Cas le peritoine Change pour ainsi dire de nature, et qu'il acquiert toujours une

ARC 56
n.° 108

une Epaisseur et une Solidité qui offre plus de resistance à la matiere purulente que les muscles et les autres teguments ensemble; de sorte que L'abcès abandonné à luy même, est necessairement determiné à percer au dehors, à moins que La pourriture ne detruise la barriere, formée par le peritoine, qui Empeche le pus de penetrer au dedans; C'est ce que j'ai observé dans plusieurs Circonstances, Et Entre autres dans le Cas que je vais avoir L'honneur de raporter.

une femme agée de 39 ans, apres avoir subi un grand mal de gorge, qui se dissipa par les remedes appropriés, fut attaquée immediatement après d'une douleur vive, qui se fit sentir d'abord dans toute L'Etendüe de l'abdomen, Et qui se fixa Ensuite du Coté gauche vis à vis et à la distance de trois ou quatre travers de doigt, de L'umbilic. la fievre etoit violente, le lieu affecté etoit Extremement douloureux quand on y appuyoit Le doigt, quoique trés Legérement, mais la Couleur de la peau n'etoit point changée, Et L'on remarquoit seulement à Cet Endroit une Elevation presque imperceptible, et d'une dureté profonde.

il seroit inutile de faire ici Le journal historique du traitement de Cette maladie, qui s'annonçat d'abord avec les symptomes les plus graves, et qui malgré Cela auroit pû se

pû determiner heureusement, si la malade avoit voulû se prêter à tout ce que je voulois faire comme je le diraj dans un moment.

Quoique les moyens les plus capables d'appaiser la douleur et l'inflammation fussent employés assiduement la maladie, cependant faisoit toujours des progrès; et bientôt une enflure ædemateuse, qui s'etendoit vers l'aine du même coté, me fit connoitre que la suppuration etoit deja determinée, et qu'il y avoit du pus rassemblé. je n'etois plus en peine que du lieu qu'occupoit l'abcès. l'ædematie circonscripte des teguments du coté malade faisoit juger que cet abcès ne s'etoit point formé dans une des parties contenües du bas ventre; et l'on pouvoit presumer au contraire que son siege etoit entre le peritoine et les muscles par la profondeur de la tumeur, et par la couleur de la peau qui n'etoit point changée.

je n'osai cependant pas d'abord prendre mon parti sur la consequance, lorsqu'on n'a pas encore rassemblé asses de faits sur certaines maladies, on craint toujours de hazarder son jugement: mais mes doutes furent bientôt levés par une tumeur de la grosseur d'un oeuf de poule, qui se manifesta à l'endroit qui avoit eté le plus doulouresux, et

Et dans laquelle on sentit peu de jours après une fluctuation bien marquée, quoiqu'a travers la peau Et les muscles,

C'etoit la sans doute le moment favorable de faire une ouverture suffisante pour Evacuer la matiere qui paroissoit rassemblée dans un seul foyer, et qui pouvoit, si Elle sejournoit trop long tems, detruire les barrieres qui l'empechoient de s'epancher dans la Cavité du ventre : aussi je me hatai de proposer l'operation à la malade ; mais Elle ne voulut jamais y consentir malgré ce que je pus luy dire pour la convaincre du danger ou Elle s'exposoit par son refus ; Et malgré les raisons pressantes que Monsieur morand luy même, qui la vit dans ce tems là, Employa pour la determiner.

je fus donc reduit à Etre spectateur des Evenements de cette maladie. je jugai bientôt qu'ils seroient funestes : la tumeur grossissoit, le foyer de l'abcès devenoit tous les jours plus Etendu, Et l'Enflure oedemateuse, qui Etoit cy devant bornée dans un petit Espace, s'étendoit non seulement par toute la Circonferance du ventre, mais Encore aux cuisses et aux jambes. quelque tems après l'abcès perça au dehors et il en sortit une quantité de matiere verdatre et fœtide. je voulois du moins alors —

alors aggrandir l'ouverture, mais la malade s'y
opposa encore enfin Elle mourut après que la
gangrene se fut Emparée de presque toutes les
\+ parties qui avoient suppuré ; j'ai passé rapidement
sur plusieurs circonstances de cette maladie pour ne
pas perdre mon objet de vüe.

après la mort de la personne j'examinay les parties
qui avoient Eté affectées. je fus plainement convaincu
que l'abcès s'etoit formé Entre les muscles et le
peritoine, les premiers etoient devenus Extremement
minces par la grande Extension qu'ils avoient
souffert; Et ils etoient pourris dans une assez grande
Etendüe à la circonferance du trou par lequel
la matiere s'etoit Evacuée. quant au peritoine
il avoit acquis presque un pouce d'Epaisseur ; il
paroissoit Etre d'une consistance charnue, mais plus
solide que ne le sont ordinairement les muscles,
Et il avoit resisté a la pourriture dont les autres
parties avoient Eté attaquées. du reste les parties
contenües du bas ventre Etoient dans un Etat
sain, à quelques adherences prés qu'elles avoient
contracté avec la surface interne du peritoine.

il paroitra peutetre singulier qu'une membrane
aussi fine aussi deliée soit devenüe assés Epaiss-

Et assés Solide pour opposér au pus rassemblé une plus grande résistance que les muscles et la peau. Mais ce n'est point ici un de ces phenomenes Extraordinaires qu'on rencontre rarement dans la pratique. La même Chose arrive toutes les fois que le peritoine Est affecté par quelque inflammation. on observe Constamment que dans les inflammations du bas ventre cette membrane S'Epaissit Considerablement et qu'elle Contracte des adherences avec les parties voisines ; de Sorte qu'elle devient une barriere impenetrable au pus à moins que la pourriture ne la detruise. aussi, hors ces cas, est-il rare de trouver de matiere purulente Epanchée dans le bas ventre dans quelque lieu que l'abcés se soit formé, parce que le péritoine qui revêt cette Cavité, et qui fournit une Enveloppe à Chaque partie qui y est Contenüe, s'oppose toujours à cet Epanchement par L'Epaissur Et la solidité qu'il á acquis.
D'ou je Conclus que la Crainte de cet Epanchement ne doit jamais faire ouvrir trop prématurément les abcés qui Surviennent

dans le voisinage du péritoine ; parceque
pour Eviter un danger Chimerique, on tombe
par cette Méthode dans des inconveniens réels,
Qui sont d'ouvrir une tumeur Encore dure
Et Enflammée, et de déranger par là
la suppuration, qui doit dissiper
l'engorgement de la partie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE